

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-53/2009 z dnia 28.04.2009 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, Królestwo Danii, tel. 00 45 969 096 90, fax. 00 45 969 096 91.

Producent: Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, CH-4002 Bazylea, Konfederacja Szwajcarska. tel.: 00 4161 323-11-11. fax: 00 4161 323-12-12.

Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Cheminova Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 212 A, 022-486 Warszawa, tel. 0-22 571 40 50, fax. 022571 40 51.


**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.**

INSTINCT 750 EC

Zawartość substancji aktywnej:

fenpropidyna /*(RS)*-1-[3-(4-*tert*-butylofenylo)-2-metylopropylo]piperidyna/ (związek z grupy morfolin)– 750 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R-53/2009 z dnia 28.04.2009 r.



Szkodliwy



Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu.

Działa drażniąco na drogi oddechowe.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



Uwaga!

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczaj wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I. OPIS DZIAŁANIA

INSTINCT 750 EC jest środkiem grzybobójczym w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego do ochrony pszenicy ozimej i jęczmienia jarego przed chorobami grzybowymi.

II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ROŚLINY ROLNICZE

1. PSZENICA OZIMA.

mączniak prawdziwy.

2. JĘCZMIEN JARY

rdza karłowa.

Zalecana dawka: 1 l/ha.

Środek stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia.

Środek można stosować również w mieszaninie z fungicydem Amistar 250 SC

Zalecane dawki: Instinct 750 EC – 0,5 l/ha + Amistar 250 SC – 0,6 l/ha.

Mieszaninę środków stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia.

Środek Instinct 750 EC w mieszaninie ze środkiem Amistar 250 SC działa zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

III. OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru przeznaczonych konsumpcji zboża – 35 DNI.

IV. OKRES PREWENCJI (okres zapobiegający zatruciu):

dla ludzi, zwierząt i pszczoł - nie dotyczy

V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po wlewniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI. PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
- Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
- Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
- Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.
- W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
- Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII. ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX. POMOC MEDYCZNA

W sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682-04-04

Rzeszów – (0-17) 866 40 25

Kraków - (0-12) 411 99 99

Sosnowiec – (0-32) 266 11 45

Lublin – (0-81) 740 89 83

Tarnów – (0-14) 631 54 09

Łódź – (0-42) 657 99 00

Warszawa – (0-22) 619 66 54

Poznań – (0-61) 847 69 46

Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności – 2 lata.

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -